

2020年9月改訂 (第3版)

貯法 室温保存、気密容器

動物用医薬部外品

猫・兔(愛がん用) 消化器内 毛玉除去剤

承認指令書番号 21 動薬第 3733 号

スッキリン

スッキリンは猫及び兔(愛がん用)の腸内にたまった毛玉をふん便と一緒に排せつするよう促すことで腸内の毛玉を除去または毛玉の形成を防止する効果があります。

【成分及び分量】

品名	スッキリン
有効成分及び含量	本剤 100g 中 流動パラフィン 44g

添加物として、麦芽エキス、グリセリン、結合剤を含む。

【効能又は効果】

猫：腸内の毛玉の除去及び形成防止

兔(愛がん用)・3ヶ月齢以上：腸内の毛玉の除去及び形成防止

【用法及び用量】

毛玉の除去

成猫：毛玉が除去されるまで毎日約1gを与える。

兔(愛がん用)・3ヶ月齢以上：

連続5日間までとし、1日1回約1gを与える。投与5日以内でも毛玉の排泄が認められなくなった時点で投与は中止とする。

毛玉形成の予防

成猫：1週間に1~2回、1回約1gを与える。

子猫：1週間に1~2回、1回約0.5gを与える。

兔(愛がん用)・3ヶ月齢以上：

2~3日の間隔をあけて1週間に2回、1回約1gを与える。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用してください。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- ・使用前に添付文書等をよく読み、十分理解した上で使用してください。

(猫に関する注意)

・本剤の投与前には健康状態について確認し、使用の可否を決めてください。

・本剤は、給餌と給餌の間に与えてください。

・ペットフード等と混ぜて与えないでください。

(兔に関する注意)

・本剤の投与前には健康状態について確認し、使用するかどうか決めてください。

・3ヵ月齢未満の兔には与えないでください。

・ペットフード等と混ぜて与えないでください。

・給餌後3時間程度空けて与えてください。

(取扱い及び廃棄のための注意)

・内容に異常を認めたものは使用しないでください。

・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

・直射日光、高温及び多湿を避けて保管してください。

・小児の手の届かないところに保管してください。

・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分してください。

2. 使用に際して気を付けること

(猫及び兔(愛がん用)に関する注意)

・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けてください。

【製品情報お問い合わせ先】

現代製薬株式会社 お客様相談窓口

☎042-556-2528 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

製造販売元

現代製薬株式会社

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原 8-4

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。